## **ABSTRACT (ITALIANO)**

**Premessa :** l'induzione farmacologia del travaglio è una procedura medica il cui scopo è di interrompere la gravidanza su indicazione materna e/o fetale. Tale intervento , mimando ciò che avviene nel travaglio spontaneo, prevede l'induzione della maturazione cervicale in presenza di una cervice immatura , e l'innesco di contrazioni miometriali.

**Obiettivi :** confrontare le modalità di espletamento del parto e gli esiti materni e/o neonatali nei travagli di parto indotti farmacologicamente rispetto a quelli insorti spontaneneamente.

Risultati: lo studio retrospettivo su 346 gravide di cui 135 sottoposte a induzione farmacologia del travaglio e 211 in cui il travaglio è insorto spontaneamente indica che i travagli indotti presentano rispetto ai travagli spontanei: una percentuale significativamente minore di espletamento parto mediante T.C, maggiore ricorso all'analgesia peridurale, e all'episiotomia, una maggiore incidenza di lacerazioni perineali e un minore ricorso al trattamento attivo nel secondamento. Nessuna significativa differenza è stata

3333osservata tra i due gruppi nella durata del travaglio e negli esiti materni e/o neonatali.

**Conclusioni:** analisi critica dei risultati ottenuti dallo studio e contributi delle evidenze scientifiche della letteratura .